



PAS D'ANTIBIOTIQUES

Otite moyenne aiguë purulente (OMA)



AIDE À LA PRISE EN CHARGE des otites moyennes aiguës (OMA) de l'enfant et de l'adulte



Suivi :

Dépistage OSM à 6 semaines et si oui, nouveau contrôle à 6 semaines

Attention :

Pas d'antibiotiques si épanchement liquidien rétro-tympanique persistant 2 semaines après OMA

Pour améliorer sa pratique : [www.activ-france.com](http://www.activ-france.com) / [www.guideline.care](http://www.guideline.care)  
Avis ORL  
Avis EMA pour antibiothérapie, si besoin

# Je suspecte une OMA

## DEVANT DES SIGNES CLINIQUES COMMUNS

- Encombrement ORL
- Contexte infectieux
- Troubles associés (digestifs, conjonctivite, anorexie,...)

## DEVANT L'ENFANT DE MOINS DE 2 ANS

- Pleurs inexplicables
- Fièvre > 39°C persistante
- Enfant se touchant l'oreille
- Baisse d'état général

## DEVANT L'ENFANT DE PLUS DE 2 ANS

- Oalgies (si absence : OMA improbable)
- Sensation d'oreille bouchée

# Je me méfie d'un terrain particulier

- Âge < à 6 ans
- Antécédents d'otites séro-muqueuses
- Dysfonction tubaire
- Hypertrophie des végétations adénoïdes
- Tabagisme passif
- Reflux gastro-oesophagien
- Mode de garde (collectivité ou nourrice)
- Terrain atopique



# Si oui, j'examine les tympans


- Bien s'équiper +++ (bon otoscope)
- Bien s'installer (enfant en confiance et bien tenu)
- Bien nettoyer le conduit :
  - du haut vers le bas
  - d'arrière en avant
  - avec outil dont on a l'habitude (curette, anse de St Paul, Bebird,...)
- Je regarde si :
  - Inflammation
  - Transparence / Opacité
  - Bombement
  - Écoulement, brèche



Tympan normal



Otite séro-muqueuse (OSM)



OMA congestive



OMA purulente



OMA perforée

### OSM :

Inflammation modérée /  
Transparence modérée /  
Bombement : 0 / Rétraction

### OMA congestive :

Inflammation modérée /  
Relief conservé / Transparence  
limite / Bombement : 0

### OMA purulente :

Inflammation +++ / Bombement +++  
/ Opacité du tympan (pus)

### OMA perforée :

Inflammation / Pas de traitement  
local si otorrhée

Si tympans non vus et doute sur  
otite, reconstrôler à J3

# Je souhaite traiter

## PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE

- De la douleur +++
- Du contexte infectieux (fièvre...)
- De l'encombrement ORL (principes de la désobstruction DOUCE - pas de seringue)

Si tympans non vus, pas de traitement  
d'emblée

Étiologie virale fréquente 60%

Si origine bactérienne :

- Haemophilus (conjonctivite) 60%
- Pneumocoque 20%
- Moraxella Catarrhalis 10%

Si otorrhée : **STREPTO TEST** sur écoulement

UN ANTIBIOTIQUE, CE N'EST PAS  
AUTOMATIQUE !

- Argumenter si décision de non traitement (ordonnance de non prescription / prescription pour maladie virale)

## Choix antibiotiques/posologies

Antibiotique adapté, à la bonne posologie, avec la bonne voie d'administration, avec une bonne durée de traitement

	Enfant	Adulte
Amoxicilline	80 mg/kg/j en 2 prises/j (max 3 g/j)	1g x3/j
Amoxicilline forte dose	150 mg/kg/j en 3 prises/j	
Amoxicilline+ac clav	80 mg/kg/j en 2 prises/j (max 3 g/j)	
Cefpodoxime	8 mg/kg/j en 2 prises/j (max 400 mg/j)	400 mg/jour en 2 prises/j
Cefuroxime		500 mg/j en 2 prises/j
Sulfamethoxazole + Trimetoprim	Sulfamethoxazole 30 mg/kg/j + Trimetoprim 6 mg/kg/j (max 800 mg/160 mg jour) en 2 prises/j	Sulfamethoxazole 800 mg/j + Trimetoprim 160 mg/j en 2 prises/j
Ceftriaxone	50 mg/kg/j une injection/j	
Pristinamycine		2 g/jour en 2 prises/j